

Maswali yanayoulizwa mara kwa mara kwa chanjo ya watoto ya COVID-19



S: Je ni tatizokwa mtoto wangu kupokea chanjo ya COVID-19 kwa wakati mmoja na chanjo nyingine?

J: Hapana, watoto na vijana wanaweza kupata chanjo ya COVID-19 na chanjo zingine kwa wakati mmoja. Kwa sababu watoto wanaweza kupata maumivu kwenye tovuti ambapo Risasi inatolewa, hata hivyo, unapaswa kufikiria kuhusu idadi ya risasi ambazo ungependa mtoto wako apige kwa wakati mmoja

S: Ni aina gani ya madhara ninapaswa kuwa na wasiwasi kuhusu baada ya mtoto wangu kupata chanjo?

J: Chanjo yoyote inaweza kusababisha madhara. Hizini kawaida kidogo (kwa mfano, kodonda cha mkono au Homa ya kiwango cha chini) na huisha ndani ya siku chache. Chanjo ya COVID-19, haina tofauti. Ikiwa mtoto wako ana mojawapoya yafuatayo baadaya kupata chanjo yake, hata hivyo, unapaswa piga simu au tembelea doktari:

- Kupumua kwa haraka au kuwa na shida ya kupumua
- Maumivu ya kifua
- Kuziria
- Homa kali yenyemshituko wa moyo (kifafa)
- Ulimi au koo iliyovimba
- Upele au mizinga kwenye mwili

S: Je mtoto wangu apate chanjo ikiwa ana mizio?

J: Watoto walio na mizio wa chakula, mpira au vitu vilavyo katika mazingira (chavua, wanyama wa kipenzi, kuumwa na widudu, n.k) wanaweza kupata chanjo ya COVID-19. Athari kubwa ya mizio kwa chanjo ya COVID-19 imekuwa nadra sana haswa kwa.

S: Mtoto wangu atafanya tofauti baada ya kupata chanjo?

J: Mtoto wako yaelekea atalalamika kwamba mkono wake unauma mahali alipopigwa risasi . Wanaweza pia kuhisi uchovu, hataki kula na kuwa na hasira na kulia zaidi kuliko kawaida. Hii haipaswi kidumu zaidi ya siku.

S: Kwa nini mtoto wangu apate chanjo ya COVID-19?

J: Kuwa chanjo watoto huwalinda wanaposhiriki katika malezi ya watoto, shulena shughuli nyinginezo. Ni vigumu kutabirijinsi mwili wa mtoto utakavyojibu ikiwa ameambukizwa na COVID-19. Watoto wengi watafanya vizuli, lakini wengine kuwa wagonjwa sana na wanahitaji kutembelea hospitali. Kupata chanjo ndiyonjia bora ya kusaidia kuzuia hili.

S: Kuna tofauti gani kati ya chanjo mbili kwa watoto chini ya miaka 5?

J: Chanjo zote mbili zimethibitishwa kuwa salama na zinafaa katika kuzuia maambukizo ya dalili ya COVID-19. Tofauti kuu ni kwamba chanjo ya Pfizer ni dozi3 na chanjo ya Moderna ni dozi 2. Chaguo muhimu zaidi ni lile la kumpa mtoto wako chanjo.

S: Je chanjo ya COVID-19 itaathiri mtoto wangu ikiwa ana ugonjwa kwa kisukari au ugonjwa wa seli ya kunyonya?

J: Hakuna ushahidi kwamba chanjo ya COVID-19 inathiri vibaya watoto wenye. Ugonjwa wa kisukari au ugonjwa wa seli mundu. Kwa kweli, ni muhimu sana kwa watoto walio na hali hizi kupewa chanjo kwani wana uwezekano mkubwa wa kupata ugonjwa mbaya wa COVID-19 ikiwa wameambukizwa.

S: Mtoto wangu ana miaka 4 . Je ningoje hadi wafikie miaka 5 ili kupata chanjo kwa watoto wa miaka 5-11?

J: Inachukua muda kuzingatiwa kuwa umelindwa kikamilifu baada ya kupata chanjo (wiki6 kwa chanjo ya Moderna na wiki 13 kwa chanjo ya Pfizer) ili mtoto wako alindwe kikamilifu haraka iwezekanavyo, ni bora sio kusubiri na kupata chanjo sasa.